

7

Что делать, если мой ребенок потенциально заражен COVID-19, но симптомы отсутствуют? Может ли вакцинация негативно повлиять на выздоровление от инфекции?

Нет. Вакцинация против одного заболевания **не ослабляет иммунный ответ человека на другое заболевание.** Нет никаких данных о том, что какая-либо плановая вакцинация повышает (или уменьшает) риск заражения вашего ребенка COVID-19 или как-то влияет на его ответную реакцию на заболевание. С другой стороны, пропущенная или отложенная вакцинация действительно создает серьезный риск, поскольку ребенок становится уязвимым для многих опасных заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцинации.

8 Существует ли вакцина против COVID-19?

Нет. COVID-19 – новое заболевание, и вакцины для его профилактики пока **не существует.** Ученые разных стран заняты разработкой такой вакцины, а ВОЗ сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы, как только безопасная и эффективная вакцина появится, обеспечить ее справедливое распределение всем нуждающимся.

www.privivki.uz

Календарь профилактических прививок в Республике Узбекистан

ВОЗРАСТ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИВИВОК
1 сутки	ВГВ-1
2-5 день	БЦЖ-1
2 месяца	ОПВ-1, Рота-1, ПНЕВМО-1, Пента-1 (АКДС-1, ВГВ-2, ХИБ-1)
3 месяца	ОПВ-2, Рота-2, ПНЕВМО-2, Пента-2 (АКДС-2, ВГВ-3, ХИБ-2)
4 месяца	ОПВ-3, ИПВ, Рота-3, Пента-3 (АКДС-3, ВГВ-4, ХИБ-3)
12 месяцев	КПК-1, ПНЕВМО-3
16 месяцев	ОПВ-4, АКДС-4
6 лет	КПК-2
7 лет (1 класс)	ОПВ-5, АДС-М-5
9 лет	ВПЧ
16 лет	АДС-М-6

Примечание

ВГВ	вакцина против гепатита В
ОПВ	оральная полиомиелитная вакцина
БЦЖ	вакцина против туберкулеза
Рота	вакцина против ротавирусной инфекции
КПК	вакцина против кори-паротита-краснухи
АКДС	вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка
АДС-М	вакцина против дифтерии, столбняка
ПНЕВМО	вакцина против пневмококковой инфекции
ИПВ	инактивированная полиомиелитная вакцина
ВПЧ	вирус папилломы человека (вакцина против рака шейки матки)
Пентавалент	вакцина против дифтерии / коклюша, столбняка, гепатита В, хиб инфекции

Родители должны прививать ребёнка в поликлинике по месту жительства!



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ВАКЦИНАЦИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ



Q & A

www.privivki.uz


ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1 Следует ли прививать моего ребенка во время пандемии COVID-19?

Да, важно, чтобы ваш ребенок своевременно получил **все плановые прививки**; они защитят его от многих опасных заболеваний сейчас и в будущем. Если в связи с карантинными мероприятиями из-за COVID-19 вакцинация в вашем регионе временно приостановлена, убедитесь в том, чтобы в последующем ваш ребенок получил все пропущенные дозы.

2 Безопасно ли прививать моего ребенка во время пандемии COVID-19?

Да, ваш ребенок может быть привит. **COVID-19 не создает какой-либо специфический риск**, связанный с вакцинами или с вакцинацией.



3 Нам сказали, что из-за COVID-19 следует оставаться дома как можно больше. Следует ли отложить прививки моему ребенку до окончания пандемии?

Нет. Важно продолжать своевременно вакцинировать вашего ребенка, насколько это возможно, **даже во время пандемии COVID-19**. Органы здравоохранения делают все возможное, чтобы службы иммунизации продолжали работать. Кроме того, максимально здоровое начало жизни является неотъемлемым правом вашего ребенка. В медицинских учреждениях принимаются меры для сведения к минимуму риска передачи COVID-19 во время дней иммунизации. В виду необходимости, в некоторых регионах плановая вакцинация может быть временно приостановлена; в таких случаях наверстывающая иммунизация будет предложена, как только учреждение вернется к нормальному функционированию.

4 Способны ли вакцины для плановой иммунизации защитить моего ребенка или меня от заражения COVID-19?

В настоящее время **нет доказательств** того, что вакцинация против других заболеваний, таких как полиомиелит или туберкулез, может предотвратить заражение COVID-19 или снизить тяжесть симптомов заболевания.

5 Может ли мой ребенок получить плановые прививки, если у него кашель или лихорадка (а тест на COVID-19 не проводился)?

Если ваш ребенок плохо себя чувствует, **обязательно сообщите об этом своему врачу**, прежде чем доставить его в медицинское учреждение. Ваш лечащий врач посоветует, следует ли отложить вакцинацию.

6 Что делать, если у моего ребенка результат теста на COVID-19 положительный, но симптомы заболевания не тяжелые?

Хотя слабо выраженные симптомы заболевания не обязательно являются противопоказанием к вакцинации, чрезвычайно важным является то, чтобы **каждый человек с положительным результатом теста на COVID-19 оставался изолированным**; это исключит заражение других, а также дальнейшее распространение вируса.

