

Для родителей



Основная информация о вакцине для родителей

- Дополнительная прививка – дополнительная защита.
- Пневмококковая вакцина обеспечит дополнительную защиту для Вашего ребенка.
- Вакцина предохранит Вашего ребенка от определенных видов заболеваний, включая менингит и пневмонию, от которых другие вакцины защиты не обеспечивают.
- Вашему ребенку будет сделана дополнительная инъекция, так как эту вакцину нельзя смешивать в одном шприце с другими вакцинами.
- Так как инъекция может вызвать некоторую болезненность и покраснение, она будет вводиться в другое место, отличное от мест введения других прививок, обычно инъекция делается в противоположное бедро. И пневмококковая вакцина вводится последней.
- После прививки медработник попросит Вас подождать в ЛПУ приблизительно полчаса, пока ребенок не успокоится после инъекции, и только потом Вы можете идти домой.
- Вам дадут парацетамол на случай повышения температуры или сильной боли в месте инъекции у ребенка по возвращении домой.

Краткая информация: то, что вы должны знать

1. Пневмококковая вакцина защищает детей от пневмонии и менингита, вызванных определенными возбудителями.
2. Вакцинация проводится тремя дозами с интервалами в один месяц между ними. Прививаются грудные дети в соответствии с национальным календарем прививок, напр., в возрасте 2 месяца, 3 месяц и 12 месяц.
3. Пневмококковая вакцина вводится в дозе 0,5 мл внутримышечно в переднебоковую поверхность средней части бедра.
4. Пневмококковую вакцину необходимо вводить в место, отличное от места введения других вакцин, которые используются в рамках одной прививочной сессии, например, в противоположное бедро.
5. Введение пневмококковой вакцины одновременно (в рамках одной прививочной сессии) с другими вакцинами РПИ безопасно.
6. У вакцинированных детей часто появляется гиперемия в месте инъекции, после инъекции дети часто могут становиться раздражительными.
7. Вакцина выпускается в 1-дозовом флаконе.
8. Вакцина должна храниться при температуре +2 - +8° С. Перед использованием флакон следует хорошо встряхнуть. Вакцину нельзя подвергать замораживанию.
9. Учитывайте показания ФТИ, как и для других вакцин.
10. Легкие заболевания у ребенка не являются противопоказанием к вакцинации.

Пневмококковая вакцина



Памятка для медработника

Вакцина

Название:

Превенар пневмококковая полисахаридная конъюгированная вакцина (адсорбированная).

Что содержит вакцина:

Пневмококковая вакцина с 13 серотипами.

Заболевания, от которых защищает эта вакцина:

Заболевания, вызываемые streptococcus pneumoniae, включая пневмонию, менингит и средний отит.

Схема вакцинации:

В возрасте 2, 3 и 12 месяцев.

Форма выпуска:

Жидкая адсорбированная вакцина в виде суспензии для инъекций. Стеклообразный флакон, содержащий одну дозу вакцины, с резиновой пробкой и ФТИ на колпачке

Хранение вакцины:

Хранение в холодильнике при температуре +2+8°C

Не допускать замораживания.

Использование пневмококковой вакцины одновременно с другими вакцинами:

Пневмококковую вакцину можно вводить в рамках одной прививочной сессии с другими вакцинами, входящими в календарь детских профилактических прививок.

Но смешивание вакцин в одном шприце не допускается (см. информацию о местах введения инъекций).

Использование вакцины

Флакон следует встряхнуть перед использованием. Проверьте статус ФТИ и срок годности вакцины. Наберите 0,5 мл с использованием стерильной иглы.

Во время прививочной сессии вакцина должна храниться охлажденной, как и другие вакцины. Если вы подозреваете, что вакцина была заморожена, то проведите шейк тест.

Место инъекции:

Переднебоковая поверхность бедра у детей в возрасте до 1 года, дельтовидная мышца – у детей более старшего возраста.

Если в рамках той же прививочной сессии будут сделаны другие прививки, то они должны вводиться в другие места, например, в противоположное бедро (или руку).

Введение 2 и более внутримышечных инъекций в область бедра ребенка в возрасте младше 12 месяцев.



Так как инъекция пневмококковой вакцины может быть немного более болезненной, чем другие инъекции, рекомендуется вводить эту вакцину последней.

Часто встречающиеся нежелательные реакции при применении пневмококковой вакцины:

Легкие реакции:

- Раздражительность, плаксивость – очень часто.
- Отек и болезненность в месте инъекции – часто приблизительно в 1 случае из 2.
- Кратковременное повышение температуры >39°C – приблизительно в 1 случае из 20

Противопоказания:

Вакцину нельзя вводить детям с тяжелой реакцией гиперчувствительности после введения предыдущей дозы вакцины.

Учет и отчетность:

Учет и мониторинг пневмококковой вакцины осуществляются отдельно, так как это не комбинированная вакцина. Все учетные и отчетные формы (прививочные карты, отчеты и таблицы для мониторинга) потребуют корректировки с учетом включения в календарь плановых прививок трех доз пневмококковой вакцины.