

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНОВОЙ ИММУНИЗАЦИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19



Министерство здравоохранения РУз, Республиканское АСЭБ предприняло ряд беспрецедентных мер, направленных на

сдерживание передачи COVID-19 и снижение отрицательного воздействия вспышки на систему здравоохранения, в том числе на службу иммунизации.

Нарушения работы служб иммунизации по проведению плановой вакцинации даже на короткое время создает угрозу повышенного риска заболеваемости и смертности в результате роста числа восприимчивых лиц и повышения вероятности возникновения вспышек управляемых инфекций.

Особое внимание следует уделить вакцино-управляемым инфекциям, способным вызывать эпидемии, а также недопущению каких-либо отступлений от продвижения к элиминации кори и сохранения Республикой статуса территории свободной от полиомиелита.

Из-за создавшихся условий в регионах, где выявляются случаи заболевания COVID-19, могут возникнуть трудности со своевременным охватом населения плановой вакцинацией, что потребует дополнительных мер по наверстыванию упущенных возможностей.



Рекомендации исполнителям программы плановой иммунизации в течение пандемии COVID-19

- Продолжать проведение вакцинации новорожденных (согласно национальному календарю прививок) в родильных домах.
- Соблюдать меры по профилактике распространения COVID-19 во время сеансов проведения иммунизации.
- Приступить к определению численности когорт детей, не получивших надлежащие им дозы вакцин, и разработать план действий для проведения наверстывающей иммунизации с учетом конкретных местных условий.
- Проводить работу по разъяснению населению преимуществ вакцинации, рисков, связанных с управляемыми инфекциями, и целесообразности проведения иммунизации как одного из приоритетов охраны здоровья в течение пандемии COVID-19.
- Соблюдать меры по профилактике распространения COVID-19 во время сеансов проведения иммунизации.
- Следует предвидеть повышенный риск появления ПППИ в следствии продолжающейся передачи COVID-19, которая может совпадать с вакцинацией.
- Для поддержания доверия населения к иммунизации меры по своевременному выявлению, извещению, расследованию, оценки причинно-следственной зависимости серьезных ПППИ и раскрытия их причин должны проводиться с особой тщательностью.

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ



Меры по профилактике распространения COVID-19 во время сеансов проведения иммунизации в ЛПУ

- Использовать имеющиеся средства связи (телефон, сотовая связь, патронажные медсестры) для информирования о днях иммунизации, назначения конкретного времени для посещения ЛПУ и обеспечения обратной связи в случаях возникновения побочных проявлений после иммунизации.
- Обучить основной и вспомогательный персонал навыкам профилактики инфекции COVID-19 в дни вакцинации в ЛПУ.
- Исключить скученность в залах ожидания, обеспечить предварительную запись на контрольные посещения здоровых людей и иммунизацию.
- Выделить проветриваемое просторное помещения для лиц, обеспечивающих уход за детьми и для детей, ожидающих иммунизацию.
- Исключить необоснованное направление родителей с вакцинируемыми детьми из кабинета в кабинет.
- Проинформировать родителей и иных сопровождающих лиц, присутствующих при вакцинации, о мерах профилактики COVID-19 (использовать маски, находиться на расстоянии не менее 1 метра от других лиц).



Стандартные меры предосторожности для персонала

- Работать в маске с соблюдением режима смены масок каждые три часа;
- Мыть руки до и после работы с каждым пациентом;
- Все медицинские работники должны быть привиты предусмотренными соответствующими инструкциями вакцинами;
- Исключить риски травм иглами или колющими предметами;
- Соблюдать порядок утилизации отходов;
- Соблюдать в помещениях правила санитарно-эпидемиологического режима:



систематическая влажная уборка с применением дезинфицирующих средств



проветривание



кварцевание



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

www.privivki.uz